Die Zirkulation des Antarktischen Zwischenwassers im Südatlantik

Dissertation

von

Claudia Schmid

Diese Arbeit wurde von der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Kiel in einer inhaltlich unveränderten Form
als Dissertation angenommen.

Kiel, im Juli 1998

Kopien dieser Arbeit können bezogen werden über:
Institut für Meereskunde an der Universität Kiel
Abt. Meeresphysik
Düsternbrooker Weg 20
24105 Kiel
Germany

Zusammenfassung

Die Zirkulation des Antarktischen Zwischenwassers im Südatlantik und die zugrundeliegende Dynamik wird in dieser Arbeit untersucht. Diese Wassermasse hat einen niedrigeren Salzgehalt als die umgebenden Wassermassen und wird in mittleren Tiefen gefunden. Der vorliegende Datensatz setzt sich aus hydrographischen Profilen, Lagrangeschen und Eulerschen Strömungsmessungen sowie Satelliten-Daten zusammen. Bei letzteren handelt es sich um Felder der Meeresoberflächentemperatur, der Anomalie der Meeresoberflächenauslenkung und der Windschubspannung. Das abgeleitete Strömungsfeld erhärtet die Hypothese einer antizyklonalen, beckenweiten Rezirkulation des Zwischenwassers in den Subtropen. Der ostwärtige Strom der Antizyklone wird zum großen Teil durch das rezirkulierte Zwischenwasser und den intermediären Malvinasstrom gespeist. Dazu kommt noch Wasser aus der südatlantischen Polarfrontzone. Die Konfluenz der beiden westlichen Randströme führt zu einer ausgeprägten mesoskaligen Variabilität, die von der Oberfläche bis in den Zwischenwasserhorizont reicht. Die Wirbel und Mäander verursachen frontenüberschreitende Vermischungsprozesse, die teilweise auch frisch ventiliertes Wasser aus der Polarfrontzone zuführen. Das vergleichsweise gleichförmige westwärtige Stromband der beckenweiten Antizyklone spaltet sich in der Santos-Aufspaltung auf, wobei etwa 3/4 des Transports als westlicher Randstrom nach Süden gehen. Das verbleibende Viertel geht entlang dem westlichen Rand nach Norden.

Mit einem einfachen Modell der ventilierten Thermokline wird gezeigt, daß der windgetriebenen Subtropenwirbel bis in eine Tiefe von über 1200 m hinabreicht. Damit wird die antizyklonale subtropische Zirkulation des Antarktischen Zwischenwassers durch das Windfeld angetrieben. Die auftretenden Unterschiede zwischen dem einfachen Modell und den Beobachtungen können auf den interozeanischen Austausch, die Randstromdynamik, die Nichtlinearität und die zeitliche Variabilität des Windfelds zurückgeführt werden.

Abstract

The circulation of the Antarctic Intermediate Water in the South Atlantic and the associated dynamical processes are studied in this thesis. This water mass has a lower salinity than the surrounding water masses and is found at intermediate depth. The used data set consists of hydrographic profiles, Lagrangian and Eulerian current measurements as well as satellite data. The latter includes fields of the sea surface temperature, the anomaly of the sea surface height and the wind stress. The inferred circulation supports the hypothesis of an anticyclonic basin-wide recirculation of the intermediate water in the subtropics. The eastward current of the anticyclone is mainly fed by the recirculated intermediate water and the Malvinas Current. An additional source is the Polar Frontal Zone of the South Atlantic. The confluence of the two western boundary currents leads to a pronounced mesoscale variability, which extends from the sea surface to the layer of the Antarctic Intermediate Water. The eddies and meanders are causing cross-frontal mixing processes, which partly lead to an import of freshly ventilated water from the Polar Frontal Zone. The comparably uniform westward flow of the basin-wide anticyclone bifurcates in the Santos Bifurcation. About 3/4 of the zonal transport is going to the south as a western boundary current. The remaining quarter flows north along the western boundary.

Experiments with a simple model of the ventilated thermocline show that the wind-driven subtropical gyre reaches down to a depth of over 1200 m. Therefore the anticyclonic subtropical circulation of the Antarctic Intermediate Water is driven by the wind field. The existing differences between the results of the simple model and the observations are most likely caused by the interoceanic exchange of water, the dynamics of the boundary currents, the non-linearity and the variability of the wind field.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

In dieser Arbeit wird die Ausbreitung des Antarktischen Zwischenwassers im subtropischen Südatlantik untersucht. Die Wassermasse zeichnet sich durch ein Minimum im Salz- und ein Maximum im Sauerstoffgehalt aus und breitet sich in allen drei Ozeanen in mittleren Tiefen aus. Im Südatlantik wurde diese Wassermasse unter dem Namen Subantarktisches Zwischenwasser von Wüst (1935) beschrieben. Er leitete aus der nordwärtigen Zunahme des Salzgehalts in der Kernschicht (dem Bereich des Salzgehaltsminimums) eine Ausbreitung nach Norden ab.

Das Antarktische Zwischenwasser kann von der Subantarktischen Front ausgehend weit nach Norden verfolgt werden (Abb. 1.1). In der Vertikalen befindet sich die Wassermasse zwischen dem Subantarktischen Oberflächenwasser bzw. dem Südatlantischen Zentralwasser und dem oberen Zirkumpolaren Tiefenwasser.



Abb. 1.1: Schema der Wassermassen im westlichen Südatlantik (Peterson und Whitworth, 1989). Die Fronten, Frontalzonen und Wassermassen sind im einzelnen: Subtropische Front (STF), Subantarktische Front (SAF), Polarfront (PF), Subantarktische Zone (SAZ), Polarfrontzone (PFZ), Antarktische Zone (AZ), Südatlantisches Zentralwasser (SACW), Subantarktisches Oberflächenwasser (SASW), Antarktisches Oberflächenwasser (ASW), Antarktisches Zwischenwasser (AAIW), Zirkumpolares Tiefenwasser (CDW), Nordatlantisches Tiefenwasser (NADW), Weddelmeer-Tiefenwasser (WSDW) und Weddelmeer-Bodenwasser (WSBW)

Die Kernschicht kann östlich von $40°W$ ab etwa $48°S$ beobachtet werden (Abb. 1.2). Westlich dieser Länge ist sie weiter südlich bis fast $60°S$ in der Drake-Straße zu erkennen. Nach Norden hin taucht die Schicht ab und erreicht ihre größte Tiefe zwischen $40°S$ und $30°S$, mit einem lokalen Maximum am westlichen Rand. Von dort aus steigt die Schicht auf $700\ m$ bis $800\ m$ an.



Abb. 1.2: Tiefenlage der Kernschicht (intermediäres Salzgehaltsminimum) des Antarktischen Zwischenwassers (Wüst, 1935).

Die Temperatur-, Salzgehalts- und Sauerstoffeigenschaften sowie die Tiefenlage der Kernschicht sprechen dafür, daß das Antarktische Zwischenwasser aus dem südlichen Ozean stammt. Als mögliche Quellen wurden die Polarfrontzone, die Subantarktische Zone und der südöstliche Pazifik beschrieben. Im folgenden wird auf diese Hypothesen eingegangen.

Deacon (1933, 1937) und Wüst (1935) vertreten die Ansicht, daß in der Polarfrontzone eine signifikante Menge von Antarktischem Oberflächenwasser unter das Subantarktische Oberflächenwasser abtaucht. Dabei vermischen sich die beiden Wassermassen, und es bildet sich Antarktisches Zwischenwasser.

Dieser Hypothese widerspricht Molinelli (1981), da er die Voraussetzung sofortiger vertikaler Vermischung über mehrere 100 m hinweg für unrealistisch hält. Er ist vielmehr der Meinung, daß im südlichen Ozean isopyknische Prozesse vorherrschend sind. Auf der Grundlage eines isopyknischen, geostrophischen Modells kommt er zu dem Ergebnis, daß ein Teil des im südöstlichen Pazifik gebildeten Subantarktischen Modewassers die Drake-Straße passiert und als Quellwassermasse des atlantischen Antarktischen Zwischenwassers zur Verfügung steht. Der Transport beträgt 6 Sv ($6 \cdot 10^6$ m^3/s) im Dichtehorizont $\sigma_0 =$ (27.1 - 27.2) kg/m^3. Das Bildungsgebiet des Subantarktischen Modewassers wird in Abbildung 1.3 durch den diagonal schraffierten Kreis symbolisiert. Zusätzlich gelangen etwa 4 Sv aus dem Indischen Ozean in den Atlantik, wobei ein Teil davon rezirkuliert und so nach kurzer Zeit wieder in den Indischen Ozean zurückströmt. Für den Dichtehorizont $\sigma_0 =$ (27.2 - 27.3) kg/m^3 hält Molinelli im Pazifik einen isopyknischen Transport von Antarktischem Oberflächenwasser über die Polarfront hinweg für möglich, wodurch die Bildung der isohalinen Thermoklinen erklärt werden kann. Diese Quelle trägt mit rund 3 Sv zum atlantischen Antarktischen Zwischenwasser bei. Des weiteren werden in dieser Schicht 2 Sv aus dem Indischen Ozean zugeführt. Diese Wassermasse ist eine Mischung aus Antarktischem Zwischenwasser des Indischen Ozeans sowie Wasser aus dem Rotem Meer und der Arabischen See. Die Fehler der zonalen Transporte gibt Molinelli mit etwa 10% an. Als Gesamtbilanz erhält Molinelli eine Zufuhr von rund 9 Sv aus dem Pazifik und etwa 2 Sv aus dem Indischen Ozean, die nach Norden exportiert werden. Damit unterliegen nur etwa 27% des nordwärtigen Gesamttransports von 11 Sv einem antarktischen Einfluß. Bei dem abgeleiteten Meridionaltransport hält Molinelli einen Fehler von einem Faktor zwei oder mehr für möglich.

Auch McCartney (1977) und Keffer (1985) vertreten die Ansicht, daß das pazifische Subantarktische Modewasser mit Temperaturen unter $4.5°C$ eine Quelle des atlantischen Antarktischen Zwischenwassers darstellt. Letzterer führt die niedrige potentielle Vorticity in der Schicht $\sigma_0 =$ (27.00 - 27.35) kg/m^3 bei etwa $40°S$ auf den Eintrag von Subantarktischem Modewasser aus dem Südost-Pazifik zurück.

Da das kälteste pazifische Subantarktische Modewasser wärmer als das frische atlantische Antarktische Zwischenwasser ist, muß es Oberflächenflüsse und/oder frontenübeschreitende Vermischung auf dem Weg durch die Drake-Straße geben (kreuzweise schraffierte Fläche in Abb. 1.3), oder es muß eine weitere Zwischenwasserquelle existieren. Piola und Georgi (1982) halten es für unwahrscheinlich, daß Oberflächenflüsse und Austausch über Front(en) hinweg ausreichen, um die Unterschiede zu erklären. Sie gehen davon aus, daß das kälteste Subantarktische Modewasser aus dem südöstlichen Pazifik nur zu einem kleinen Teil zum atlantischen Antarktischen Zwischenwasser beiträgt, während die wichtigste Quelle in der Nähe der südatlantischen Polarfront liegt (senkrecht schraffierte Fläche in Abb. 1.3).



Abb. 1.3: Schematische Darstellung der Verteilung des Antarktischen Zwischenwassers anhand ausgewählter Isohalinen in der Kernschicht (durchgezogen), zusammengestellt aus mehreren im Text erwähnten Veröffentlichungen. Die gestrichelten Linien deuten die nördliche Grenze der Beobachtung des Antarktischen Zwischenwassers im Indischen und Atlantischen Ozean an. Die im Text genannten Quellregionen sind ebenfalls angedeutet, wobei die nördlich (südlich) der Polarfront einfach (gekreuzt) schraffiert sind.

Ausführliche Untersuchungen der Eigenschaften und Ausbreitungspfade des Subantarktischen Modewassers nach dem Passieren der Drake-Straße beleuchten diese Fragen (Piola und Gordon, 1989). Das Wasser strömt entlang der südamerikanischen Küste, unter dem Falklandstrom/Malvinasstrom, nach Norden. In der mit dem Malvinasstrom assoziierten Zyklone sehen Piola und Gordon drei Subantarktische Modewasser-Typen mit den Eigenschaften (Abb. 1.4):

$4.8°C$, Salzgehalt ≥ 34.2, σ_0= (27.05 - 27.10) kg/m^3 (Typ A)

$3.8°C$, Salzgehalt < 34.2, σ_0= (27.15 - 27.20) kg/m^3 (Typ B)

etwa $2.5°C$, Salzgehalt $= 34.15$, σ_0= 27.25 kg/m^3 (Typ C)



Abb. 1.4: Potentielle Temperatur-Salzgehalts-Verteilung in der Subantarktischen Zone in der nördlichen Drake-Straße (Piola und Gordon, 1989). Die Daten wurden im Südsommer zwischen 1975 und 1980 im Rahmen der „International Southern Ocean Studies" gewonnen. Die Pfeile weisen auf die im Text genannten Wassertypen A und B hin. Das Quadrat bezeichnet die Unterkante der isohalinen Thermokline des Südostpazifiks (Molinelli, 1978).

Das Wasser vom Typ A befindet sich an der Außenkante der Zyklone. An der Innenseite der Zyklone kann der Wassertyp C beobachtet werden. Im Gegensatz zum Wassertyp A ist das Wasser vom Typ C in der Subantarktischen Zone der Drake-Straße nicht vorhanden, daher muß es atlantischen Ursprungs sein. Das dazwischenliegende Wasser vom Typ B kann als Vermischungsprodukt der Typen A und C angesehen werden. Dieses neue Antarktische Zwischenwasser geht im Südatlantischen Strom nach Osten.

Wie erwähnt breitet sich das Antarktische Zwischenwasser im Atlantik nach Norden aus, das gilt auch im Pazifik und im Indischen Ozean. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Unterschiede zwischen den drei Ozeanen, die in Abbildung 1.3 schematisch dargestellt sind. Neben den weiter unten zitierten Arbeiten wurde für diese Abbildung auch der Atlas von Olbers et al. (1992) verwendet. Im Atlantik dringt das Antarktische Zwischenwasser am weitesten nach Norden vor, es überquert den Äquator und kann bis etwa 30°N beobachtet werden (Talley, 1996). Im Pazifik kann man die Wassermasse dagegen nur bis rund 5°N verfolgen, wobei jedoch 5°S nur selten überschritten wird (Reid (Jr.), 1965; Reid, 1986; Levitus et al., 1994; Tsuchiya und Talley, 1996). Neben dem im Süden gebildeten Antarktischen Zwischenwasser gibt es im Pazifik ein weiteres durch ein Minimum im Salzgehalt ausgezeichnetes Zwischenwasser, dessen Ursprung im Norden liegt. Dieses Nordpazifische Zwischenwasser breitet sich nach Süden aus und trifft dort auf das Antarktische Zwischenwasser, wodurch ein weiteres nordwärtiges Vordringen der letztgenannten Wassermasse verhindert wird. Im Atlantik bildet sich dagegen im hohen Norden das Nordatlantische Tiefenwasser, das sich unterhalb vom Antarktischen Zwischenwasser bis etwa $50°S$ ausbreitet (vgl. Abb. 1.1). Beide Wassermassen spielen eine wichtige Rolle beim großen ozeanischen Förderband ("conveyor belt"; Broecker et al., 1985, 1991; Abb. 1.5). Im Indischen Ozean kommt das Antarktische Zwischenwasser nicht über den Äquator hinaus (Wyrtki, 1971), und der Salzgehalt in der Kernschicht nimmt deutlich stärker zu als im Atlantik und Pazifik. Neben dem Antarktischen Zwischenwasser gibt es das salzreichere Zwischenwasser, welches im wesentlichen aus dem Roten Meer und der Arabischen See stammt. Eine kleine Menge von Zwischenwasser deutet sich auch als Zunge beim Indonesischen Durchstrom an.



Abb. 1.5: Schema des weltweiten ozeanischen Förderbands (Siedler und Zenk, 1997; nach Broecker, 1991).

Die Zirkulation des Weltozeans kann nach der oben erwähnten Hypothese des ozeanischen Förderbands wie folgt beschrieben werden. Das im Nordatlantik gebildete Nordatlantische Tiefenwasser breitet sich als tiefer westlicher Randstrom nach Süden aus und wird im Bereich des Antarktischen Zirkumpolarstroms nach Osten in den Indischen und Pazifischen Ozean transportiert, wo jeweils ein Teil nach Norden strömt und aufsteigt. Von dort breitet sich das neu gebildete Oberflächen- und Zwischenwasser nach Westen aus, wobei es zu starken Veränderungen durch Vermischungsprozesse und Oberflächenflüsse kommt. Aus dem Indischen Ozean wird das Wasser in den Atlantik transportiert (Warmwasserroute). Ein weiterer Teil des Wassers im Antarktischen Zirkumpolarstrom gelangt durch die Drake-Straße in den Atlantik zurück (Kaltwasserroute). Die Bedeutung dieser beiden Wege, die unter anderem auch von Gordon (1986) und Rintoul (1991) untersucht wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Während Gordon (1986) die Warmwasserroute für wichtiger hält, ist Rintoul (1991) der Ansicht, daß die Kaltwasserroute eine größere Rolle spielt. Das auf den beiden Wegen in den Atlantik eingetragene Wasser breitet sich nach Norden aus. Auch das in der Antarktischen Zone gebildete Antarktische Bodenwasser dringt im Atlantik weit nach Norden vor (Abb. 1.1). Der südwärtige Transport von Nordatlantischem Tiefenwasser wird somit durch den nordwärtigen Transport von Oberflächenwasser, Antarktischem Zwischenwasser und Antarktischem Bodenwasser balanciert. Unter Antarktischem Bodenwasser werden in dieser Arbeit das untere Zirkumpolare Tiefenwasser, das Weddelmeer-Tiefenwasser und das Weddelmeer-Bodenwasser zusammengefaßt.

Tab. 1.1: Geostrophischer Meridionaltransport (M) von Antarktischen Zwischenwasser im Südatlantik. (a) Nettotransporte über transozeanische Schnitte. (b) Transporte im östlichen Randstrom. IGY steht für das „International Geophysical Year“ (1957-1959). Die Oceanus 133-Schnitte wurden 1983 aufgenommen. Die WOCE-Schnitte A9 und A10 wurden 1991 bzw. 1993 durchgeführt.

Breite	M/Sv	Quelle	Datenbasis	Methode
(a)				
$8°S$	≈ 5	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$11°S$	8	Holfort (1994)	Oceanus 133	Inversmodell
$16°S$	≈ 5	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$19°S$	6.5	Holfort (1994)	WOCE A9	Inversmodell
$23°S$	5	Holfort (1994)	Oceanus 133	Inversmodell
$24°S$	≈ 5	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$30°S$	5	Holfort (1994)	WOCE A10	Inversmodell
$32°S$	≈ 5	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$32°S$	5	Rintoul (1991)	IGY	Massenerhaltung
(b)				
$8°S$	-15	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$11°S$	4	Holfort (1994)	Oceanus 133	Inversmodell
$19°S$	3	Holfort (1994)		Inversmodell
$23°S$	1.2	Stramma und Peterson (1989)	Oceanus 133	Ref. σ_0=27.4 kg/m^3
$23°S$	2.5	Stramma und Peterson (1989)	Oceanus 133	Ref. σ_0=27.75 kg/m^3
$23°S$	2.4	Stramma und Peterson (1989)	Oceanus 133	Ref. Boden
$23°S$	≈ 0	Holfort (1994)	Oceanus 133	Inversmodell
$24°S$	≈ 0	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$24°S$	0.4	Stramma und Peterson (1989)	Crawford, 1958	Ref. σ_0=27.75 kg/m^3
$24°S$	0.0	Stramma und Peterson (1989)	Crawford, 1958	Ref. Boden
$28°S$	2.4	Stramma und Peterson (1989)	Meteor, 1925	Ref. σ_0=27.4 kg/m^3
$28°S$	5.4	Stramma und Peterson (1989)	Meteor, 1925	Ref. σ_0=27.75 kg/m^3
$28°S$	9.0	Stramma und Peterson (1989)	Meteor, 1925	Ref. Boden
$30°S$	5.5	Holfort (1994)	WOCE A10	Inversmodell
$32°S$	5	Fu (1981)	IGY	Inversmodell
$32°S$	16	Rintoul (1991)	IGY	Massenerhaltung
$32°S$	3.4	Stramma und Peterson (1989)	IGY	Ref. σ_0=27.4 kg/m^3
$32°S$	6.0	Stramma und Peterson (1989)	IGY	Ref. σ_0=27.75 kg/m^3
$32°S$	7.6	Stramma und Peterson (1989)	IGY	Ref. Boden

Die Angaben für den nordwärtigen geostrophischen Nettotransport im Zwischenwasserhorizont des Südatlantiks schwanken zwischen 5 Sv und 8 Sv (Tab. 1.1a). Der von Molinelli (1981) abgeleitete Transport von 11 Sv, der im Gegensatz zu den anderen Transporten nicht auf einem Zonalschnitt beruht, ist etwas höher. Molinelli hatte jedoch auf den möglicherweise großen Fehler dieser Angabe hingewiesen (s. o.). Die mit der klassischen geostrophischen Methode ermittelten Transporte im nordwärtigen östlichen Randstrom betragen bis zu 9 Sv bei und südlich von 23°S (Tab. 1.1b). Die von Rintoul (1991) ermittelten 16 Sv enthalten nicht nur den Randstromtransport, sondern den gesamten Transport zwischen 10°E und dem östlichen Rand. Bei den mit der Inversmethode bestimmten Transporten treten bis zu 6 Sv auf. Die Mehrfachbestimmungen der Transporte machen deutlich, daß eine signifikante Abhängigkeit vom gewählten Referenzniveau bzw. dem verwendeten Modell vorliegt.

Aus den hier gezeigten Resultaten kann man schließen, daß der meridionale Nettotransport recht gut bekannt ist und eine geringe zeitliche Variabilität aufweist. Letzteres wird insbesondere in den Ergebnissen bei etwa 30°S deutlich. Demgegenüber weist die Frage der Ausbreitungspfade des Antarktischen Zwischenwassers noch einige Unklarheiten auf.

Die Hypothese eines durchgehenden westlichen Randstroms wurde von Wüst (1935) aufgestellt, wobei er die Kernschichtmethode auf die Daten der Meteor-Expedition von 1925-1927 anwendete. Defant (1941) und Sverdrup et al. (1942) akzeptierten die Schlußfolgerungen von Wüst und nahmen an, daß der Subtropenwirbel im Südatlantik auf eine dünne Schicht oberhalb des Antarktischen Zwischenwassers begrenzt ist. Es gab jedoch damals schon Hinweise auf eine antizyklonale Zirkulation des Antarktischen Zwischenwassers in den Subtropen. So zeigen Defants Karten der absoluten Topographie in der 800 $dbar$ und auch in der 1400 $dbar$-Schicht eine antizyklonale subtropische Zirkulation (Defant, 1941). Aus den 50er und 60er Jahren stammen einige Veröffentlichungen, in denen die Hypothese einer antizyklonalen subtropischen Zirkulation des Zwischenwassers aufgestellt wird (z. B. Martineau, 1953) und deren Zirkulationsschemata keinen nordwärtigen Strom im westlichen Südatlantik zwischen 40°S und 20°S zeigen (z. B. Riley, 1951; Taft, 1963). Taft ist der Ansicht, daß der nordwärtige westliche Randstrom in den Subtropen so schmal ist, daß er ihn in seinen Karten nicht sehen kann.

Die nordwärts gerichteten geostrophischen Transporte zwischen 32°S und 28°S am östlichen Rand stehen im Einklang mit der Hypothese eines Subtropenwirbels auf Zwischenwasserniveau (Tab. 1.1b). Auch die Horizontalkarten der dynamischen Topographie im Zwischenwasserhorizont zeigen einen deutlich ausgeprägten antizyklonalen Wirbel, der im Unterschied zu dem oberflächennahen Subtropenwirbel, am Nordrand eine verstärkte Zonalität der Transporte aufweist (z. B. Buscaglia, 1971; Reid, 1989, s. Abb. 1.6). Eine ausführliche Tracer-Studie aus dem westlichen Südatlantik spricht ebenfalls für die Subtropenwirbel-Hypothese; die Konzentration des neugebildeten Antarktischen Zwischenwassers nimmt danach am westlichen Rand zwischen 40°S und 35°S von Süden nach Norden zu (Maamaatuaiahutapu et al., 1992).

Umstritten ist die Frage, ob es zusätzlich zu dem intermediären Subtropenwirbel auch einen nordwärtigen westlichen Randstrom gibt. Buscaglia (1971) schließt einen solchen nordwärtigen Zwischenwassertransport über die Konfluenzzone hinweg (zwischen $40°S$ und $20°S$) aus. Neue Bedeutung erlangte die Randstrom-Hypothese durch direkte Strömungsmessungen von Evans und Signorini (1985). Sie beobachteten nordwärtige Geschwindigkeiten am westlichen Rand zwischen $20°S$ und $24°S$. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, daß ihre Daten für den Beweis eines durchgehenden, nordwärtigen westlichen Randstroms nicht ausreichen. Die Frage kann auch in der Tracer-Studie von Larqué et al. (1997) nicht beantwortet werden. Lagrangesche Strömungsmessungen zwischen $40°S$ und $28°S$ zeigen kein nordwärtiges Stromband am westlichen Rand (Boebel et al., 1997).

Der Diskurs über die Ausbreitungspfade des Antarktischen Zwischenwassers kann wie folgt zusammengefaßt werden (s. a. Abb. 1.6): Das durch die Drake-Straße kommende Subantarktische Modewasser teilt sich nach dem Eintritt in den Atlantik in zwei Zweige, einer folgt dem Antarktischen Zirkumpolarstrom und der andere geht unter dem Malvinasstrom (als Antarktisches Zwischenwasser) nach Norden. Die Konfluenz mit dem südwärtigen Brasilstrom bewirkt ein Abschwenken nach Osten, wobei es noch unklar ist, ob ein Teil des Zwischenwassers am westlichen Rand weiter nach Norden vordringt. Ein weiterer möglicher Weg nach Norden sind kleinere antizyklonale Zirkulationsschleifen innerhalb der beckenweiten Subtropischen Antizyklone, analog zum Brasilrückstrom an der Oberfläche (z. B. Stramma, 1989; Rintoul, 1991). Ob es dieselben gibt muß jedoch noch untersucht werden. In der Konfluenzzone und im Südatlantischen Strom kommt es zur Vermischung zwischen dem frischeren Wasser aus dem Süden und dem rezirkulierten Wasser. Auch eine Vermischung zwischen dem Antarktischen Zirkumpolarstrom und dem Südatlantischen Strom erscheint wahrscheinlich. In beiden Fällen dürften mesoskalige Wirbel eine wichtige Rolle spielen.

Im östlichen Südatlantik kommt es zu einer Verzweigung des Stroms in ein ost- und ein nordwärtiges Stromband. Hier wird noch Antarktisches Zwischenwasser aus dem Indischen Ozean zugeführt. Der interozeanische Austausch ist in den beiden Karten von Reid (1989) zu erkennen (Abb. 1.6). Es deutet sich an, daß aus dem Indischen Ozean weniger Wasser in den subtropischen Südatlantik gelangt als aus dem Pazifischen Ozean, wie es unter anderem auch von Rintoul (1991) beschrieben wird (s. o.). Die Transporte zwischen dem Indischen und dem Atlantischen Ozean sind jedoch noch nicht genau bekannt. Die Zwischenwassertransporte vor Südafrika sowie die zugrundeliegende Dynamik werden zur Zeit untersucht (KAP der Guten Hoffnung EXperiment - KAPEX, Boebel et al., 1998). Der nordwärtige östliche Randstrom dreht schließlich nach Westen und geht in den nördlichen Ast des Subtropenwirbels über, der den westlichen Rand zwischen $20°S$ und $30°S$ erreicht, wo es wiederum zu einer Aufspaltung kommt (Santos-Aufspaltung, Boebel et al., 1998). Die subäquatoriale Zirkulation soll hier nicht besprochen werden, da für diese Arbeit nur relativ wenige Daten aus der Region vorliegen.